

Premisas para la redacción – revisión de preguntas tipo test

La estructura de las preguntas

En relación con los enunciados de las preguntas se recomiendan los siguientes puntos:

- **Abreviaturas:** los acrónimos deben desglosarse cuando sean necesarios (son necesarios cuando tiene entidad identificativa en sí mismas). Cuando un término aparece una o dos veces, a no ser que el acrónimo aporte mucho valor por representar una entidad que el colectivo identifica gracias a este, (SCA, IRC, HTA), entonces este acrónimo puede evitarse y solo se muestra el concepto desglosado.
- **No deben ir superíndices de bibliografías** y no se deben incluir elementos como tablas o figuras.
- La pregunta debe iniciar con número, seguir con un punto, un espacio y el enunciado. Ejemplo:
 - 1. ¿Cuáles de las siguientes opciones de tratamiento son opciones no recomendadas en la NAC?
- **Formular la pregunta de forma clara ya sea de forma directa o indirecta:** complemento + modal de pregunta + sujeto + verbo.

Veamos algunos ejemplos:

Ejemplo
<ul style="list-style-type: none"> • (directa) ¿Cuáles de las siguientes opciones de tratamiento son opciones no recomendadas en la NAC? • (directa) De los tratamientos de la NAC, ¿cuáles son tratamientos no recomendados? • (Indirecta) De los siguientes tratamientos propuestos ¿cuál no sería una opción recomendada? • (Indirecta) De los siguientes tratamientos propuestos, indica la opción incorrecta.

- Evitar enunciados en frases pasivas

Veamos algunos ejemplos:

No recomendable	Recomendable
Tres elementos son recomendables en la valoración de la EPOC:	¿Cuáles de los siguientes elementos son recomendables valorar en la EPOC?

- Evitar enunciados que exigen acabar con una opción de respuesta para tener sentido (para completar la frase) puesto que no dejan clara la pregunta.

Veamos algunos ejemplos:

No recomendable	Recomendable
<p>Es un criterio de HTA...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tener una PA 140/90 	<p>¿Cuál de los siguientes es un criterio diagnóstica de HTA?:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tener una PA >140/90
<p>Respecto a la investigación del ACO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Existen abundantes estudios prospectivos con asmáticos fumadores 	<p>Respecto a la investigación del ACO, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Existen abundantes estudios prospectivos con asmáticos fumadores
<p>No es una característica fundamental del ACO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suele aparecer en menores de 40 años, con antecedentes de asma en infancia o juventud 	<p>¿Cuál de las siguientes características no es fundamental del ACO?:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suele aparecer en menores de 40 años, con antecedentes de asma en infancia o juventud

Si se admite si queda clara la pregunta y le sigue un listado de elementos después de “:”

Veamos algunos ejemplos:

No recomendable	Recomendable
<p>De los Criterios de HTA todos son correctos excepto...:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tener una PA 140/90 	<p>De los Criterios de HTA todos son correctos excepto uno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tener una PA >140/90

- Evitar la doble negación.

Veamos algunos ejemplos:

No recomendable	Recomendable
<p>No es incorrecto administrar uno de los siguientes antibióticos en la NAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levofloxacino... 	<p>¿Cuál de los siguientes antibióticos a administrar sería correcto en el tratamiento de al NAC?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Levofloxacino
<p>No resulta inadecuado tratar a un paciente con NAC con:</p>	<p>¿Cuál de los siguientes tratamientos resultan adecuados para tratar la NAC</p>

- Se recomiendan **preguntas directas sin enunciados ambiguos**. La formulación de la pregunta debe ser clara.

Veamos algunos ejemplos:

No recomendable	Recomendable
<p>Son tratamientos desrecomendados de la NAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levofloxacino • Etc 	<p>De los tratamientos de la NAC, ¿cuáles son tratamientos no recomendados?</p>

- Enunciados. **No abusar de un mismo formato de enunciado de forma continuada**, p.ej: cual de las siguientes opciones es falsa: se deba tratar de alternar con otros formatos. Si se decide hacer varias de este tipo se debe cambiar el sustantivo por un sinónimo: “enunciado, opción, afirmación, aseveración.
- En las opciones de respuesta tratar de no hacer misceláneas muy heterogéneas sino opciones que compartan algún criterio común que no sea solo la “corrección o incorrección de estas”. En el caso de querer hacer una serie de opciones heterogéneas esto debe ser bien presentado desde el enunciado.

Veamos algunos ejemplos:

No recomendable	Recomendable
<p>Señale cuál de las siguientes respuestas es falsa:</p>	<p>Señale cuál de las siguientes afirmaciones generales sobre la tos es falsa:</p>

<p>A) La tos consta de tres fases: una fase inspiratoria, una fase compresiva y una fase expulsiva</p> <p>B) La tos aguda se define como aquella que tiene una duración inferior a tres semanas</p> <p>C) La tos crónica se define como aquella que tiene una duración mayor de seis meses</p> <p>D) La prevalencia de tos crónica es mayor en mujeres que en hombres</p>	<p>A) La tos consta de tres fases: una fase inspiratoria, una fase compresiva y una fase expulsiva</p> <p>B) La tos aguda se define como aquella que tiene una duración inferior a tres semanas</p> <p>C) La tos crónica se define como aquella que tiene una duración mayor de seis meses</p> <p>D) La prevalencia de tos crónica es mayor en mujeres que en hombres</p>
---	---

- Cuando se hagan el formato de enunciado señale la “respuesta falsa” se debe contextualizar con una coletilla como “Respecto de la tos aguda y su valoración en el ámbito de urgencias....”

Veamos algunos ejemplos:

No recomendable	Recomendable
<p>Señale cuál de las siguientes respuestas es falsa:</p> <p>A) La tos consta de tres fases: una fase inspiratoria, una fase compresiva y una fase expulsiva</p>	<p>Señale cuál de las siguientes afirmaciones generales sobre la tos es falsa:</p> <p>A) La tos consta de tres fases: una fase inspiratoria, una fase compresiva y una fase expulsiva</p>

Las opciones de respuesta

- Las preguntas tipo test deben tener **5 respuestas** (A), B), C), D) y E)) de las cuales **solo una debe ser correcta**.
- Deben enunciarse con letra en mayúscula seguido de un paréntesis y un espacio. Veamos el ejemplo:
 - A) La prevalencia de tos crónica es mayor en mujeres que en hombres
- La respuesta correcta debe indicarse a tras la presentación de las 5 posibles respuestas del siguiente modo:

○ RESPUESTA: A

- Las **opciones de respuesta** deben tener sentido en sí mismas, no deben exigir un enunciado. Deben ser **frases completas**, a poder ser “sujeto-verbo-predicado”.
- Se deben evitar **respuestas totalitarias** del estilo "todas son correctas", "A y C son correctas", "ninguna es correcta".
- Se debe **evitar que la opción correcta recaiga frecuentemente en una misma posición** (por ejemplo, la D) y tratar de que haya un equilibrio.
- En las opciones de respuesta también deben **tener sentido en sí mismas**, especialmente en su ligamen con el enunciado y no se deben poner opciones de respuesta que resulten **ridículas**.
- En relación con las opciones de respuesta se recomienda no vincular estas opciones a presentaciones comerciales que puedan quedar obsoleto

Veamos algunos ejemplos:

No recomendable	Recomendable
<p>Con respecto al reflujo, señale la afirmación falsa:</p> <p>A) Durante los episodios de apnea se produce un incremento de la presión intratorácica negativa.</p> <p>B) Ocasiona la regurgitación del contenido gástrico y una potenciación del reflujo al disminuir el tono.</p> <p>C) De los esfínteres esofágicos durante el sueño.</p> <p>D) En los pacientes con síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) se identifican pHmetrías por debajo de 10.</p>	<p>Con respecto al reflujo, señale la afirmación falsa:</p> <p>A) Durante los episodios de apnea se produce un incremento de la presión intratorácica negativa.</p> <p>B) Ocasiona la regurgitación del contenido gástrico y una potenciación del reflujo al disminuir el tono.</p> <p>C) De los esfínteres esofágicos durante el sueño.</p> <p>D) En los pacientes con síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) se determinan pHmetrías por debajo de 10.</p>